

《ナ行》

	植物名等	分類	内容による分類	内容	回答
1	ナス	野菜	育て方	4株、高さ1m30cm位。つる(脇芽)がいっぱい伸びてジャングルになりそう。	下から4～5節は芽かきを行ない、その上から子が出たら、2～3節残し摘芯。その後脇芽が出るが、同様に摘芯する。その頃になると親の古葉は摘む。そうするとジャングルにならない。病害虫の発生も少なくて済む。
2	ナス	野菜	施肥	苦土石灰とたい肥を同時に畑にばら撒いたが、一緒でも大丈夫か	混ぜて散布するときは、化学肥料はダメであり、夏野菜を植える前には石灰を1週間以上前にまき、よく土をかきまぜておく必要がある。
3	ナス	野菜	植え方	植床の作り方	<ol style="list-style-type: none"> 1. まず深さ30cm位の溝を掘る。 2. その溝にコンポストを5～6cm位の厚さに敷く。その上にたい肥を4～5mあたり1袋散布し、その上に化学肥料1m当り50g位を散布 3. 掘上げた土を3分の1位溝に戻し、軽く攪拌する。 4. その後土寄せをして高さ15～30cm位、巾4～50cmの畦を作る。 5. 苗は4月下旬～5月上旬頃定植する。 6. 5～6月になって、伸び出したら20日位の間隔で追肥を行う。
4	ナス	野菜	育て方	土作り、肥料の施し方、管理について	4月中に耕耘し、植床をつくっておく。5月上旬に接木苗を購入して定植する。発育を見ながら追肥や誘引等を行い管理していく
5	ナス	野菜	診断	ナスを4本ずつ植えているが、育ちに差がある。管理が悪いのか。肥料か。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 10本植えても同じ伸び方はしない。10～20cm位の差はつく。 2. 原因は土壌条件の差と考えた方がよい。
6	ナス	野菜	病害虫(防除)	アブラムシがついたので、消毒を2回行ったら葉が黄色くなってしまった。	規定以上に濃い農薬を散布すると薬害が出る。特に先端の若い葉は害を受け易い。追肥をして経過を見る。生長点がとまれば脇芽が出る。
7	ナス	野菜	育て方	50cm位に伸びている。下の方から脇芽がいっぱい。	下から5～6節は脇芽は摘む。7～8節目位に勢いの良い枝が3～4本出るのでこれを伸ばす。摘芯は着果してから。先に2枚葉をつけ、摘芯する。そうすれば脇芽が伸びて着果する。
8	ナス	野菜	診断	下葉が黄色くなって、余り元気がない。	下葉ということなので、天候の関係から、日照不足と気温が上がらない日が多いことが考えられる。今後は病害虫の防除と地温を上げるような工夫が必要と思われる。
9	ナス	野菜	病害虫(防除)	所々に突起したような面があり堅く、切ってみると黄色くなっている。又、葉が全体に黄色くなってきたので、剪定した。	<ol style="list-style-type: none"> 1. カメムシの食害跡。食べても心配はない。 2. 葉が全体に黄色くなっていたら、アカダニの被害の心配あり。

10	ナス	野菜	病虫害(防除)	テントウムシダスシの幼虫を防ぐにはどうしたら良いか。	発見したら早めにダイアジノン乳剤(劇薬)を数回散布する。
11	ナス	野菜	育て方	鉢植えにしているが、1株に2ヶ位しかなかった。どうしてか	夏場の水不足が原因と思われる。ナスは、水と肥料を必要とする作物である。
12	ナス	野菜	植え方	大型のトンネルハウスで野菜を作りたい。苗床はどのように作るか。	床土は充分発酵した堆肥又は細かく砕いた腐葉土と土を等量混合したもの。肥料は苗床から1個ずつポットに移植するときに施す。
13	ナス	野菜	病虫害(防除)	ネコブセンチュウがつき、生育が良くないので、土壌処理をしたい。どのようにすれば良いか。	連作は避け、トウモロコシなどを植える(冬は麦)。 土壌処理方法…バイデートL粒剤(劇薬)(植付け前処理する) 1㎡当り30gを全面散布。20cm位よく耕し混合する。株間処理の場合、1株当り1.5~2.5gを撒き、土とよく混合する。
14	ナス	野菜	土づくり	事前に準備しておくことは何か。	深く耕して堆肥・油粕・化成を全面にバラ撒いてかき混ぜておく。整地は植付けの直前に行く。
15	ナツツバキ	庭木	剪定	ナツツバキの鉢植え2年目。今年は開花したが、その後枝がどんどん伸びている。切っても良いか。	1. 枝が伸びる時期はまだ枝先が軟らかいので少し硬化するのを待って剪定する。剪定の程度は、込み過ぎているなら枝元から間引くように、又伸びすぎようなら1/3か2/3剪定する。全体のバランスを考えて。 2. 剪定の時期は梅雨末期まで。残された短い枝に夏の間花芽ができる。 3. 秋剪定は10~11月、全体のバランスを整える。
16	ナツツバキ	庭木	育て方	どのくらいの大きさになるか。育て方はどのようにするか。	そのままだと10mくらいになってしまうので、毎年整枝か剪定して木の大きさを調整する。
17	ナツツバキ	庭木	病虫害(防除)	次々に庭木が枯れる。根に白い綿様のものがいっぱい付いていた。病気か。	1. 白絹病と思われる。(紋羽病も似る)土壌病害で菌は長い間土中にあり庭木を枯らす。菌は10年位土中に残る。 2. <<防除方法>>①ベンレート水和剤1000倍液を1本当り5ℓ位灌注する。②良質の腐葉土を投入し、良質な土壌微生物を増す。③枯れた木の根をできるだけ掘り取り焼却する。④4月頃にもう1度ベンレート水和剤を灌注する。 3. 土壌病害専用薬のバスアミド微粒剤(劇薬)が入手できたら、5月以降に使用。
18	ナツツバキ	庭木	植え方	植え方を知りたい。	根巻苗、ビニール材で巻いてある場合は、半分位埋めて材料をはずし、根がいたまなように植える。植え方は、溝を掘り、堆肥を下に入れ土と混合し、その上に土を入れて植え込む。水を充分与えて少しゆする。支柱を立て、敷きわらを敷き詰め、乾燥したら水を与える。
19	ナツツバキ	庭木	植え方	ポットのまま置いて良いか。又はすぐ植え替えても大丈夫か。	ポットから抜いてすぐ植えて良い。すぐ植えられない場合も3月頃まではそのままでも良い。管理は表面の土が乾いてきたら水遣りする。土中に鉢を埋めておくのは良い。

20	ナツミカン	果樹	病虫害(防除)	実なりが悪い。枝先(新芽)が縮れてしまっている。病気か。	夏芽の先が縮れているのはハモグリガかアブラムシの害と思われる。白い模様が入っている場合はハモグリガによるもの。モスピラン水溶剤(劇薬)を散布する。スミチオンでも良い。実なりが悪いのは肥料を12月(元肥有機肥料)と4月・7月に化成肥料を追肥。冬間引き剪定をし、マシン油乳剤でカイガラムシを防除する。
21	ナツミカン	果樹	その他	収穫時期と肥料、防除について	1月下旬に収穫し、1ヶ月位貯蔵する。元肥として12月有機肥料を施し、追肥は4月と7月に化成を施す。防除は冬に機械油乳剤を散布する。
22	ナバナ	草花	育て方	まき時と管理の方法	9~10月に直まき又はポットまき。5~6cmの間引きをする。アオムシに食害されるので、オルトランなどを散布する。
23	ニラ	野菜	育て方	株分けについて	一度植えると何年でも使える。持っている人に株分けしてもらえば、後はいくらでも増やせる。種子での購入は多量なので、4~5月に売り出す苗を植える方が良い。宿根草で2~3年に1回掘り上げ株分けして余分なものは捨てる。
24	庭木	庭木	診断	庭木で日陰に強いものは何か。	1. 関東地域で夏に太陽光の届かぬところはない。従って一日に何時間陽が当たるかであって、大部分は植えられる。
25	庭木	庭木	病虫害(防除)	庭木に白く綿様のものがついており、(隣近所も同じ)それが網戸について困っている。	1. アオバハゴロモと言う虫が植木の枝に産卵。幼虫が自分の体を保護するために出したワタが白く見えるもの。 2. 防除はスミチオン乳剤(1000倍)を散布すると良い。
26	ニンジン	野菜	育て方	5月に蒔いて収穫したが、あまり良いものが出来なかった。また撒きたいがどうすれば良いか。	ニンジンには春蒔きは秋蒔きより難しい。秋蒔きは早ければ7月中、梅雨明け前に蒔くと発芽が揃う。播種はスジ蒔きの方が蒔き易いし、管理が楽。生育するに従い、3回間引き最後は10~15cm間隔とする。
27	ニンジン	野菜	土づくり	秋野菜を作りたいが、土づくりとして堆肥と若土石灰をどのように蒔いたらよいか。	前作の茎や根をよく片付けてから、完熟堆肥や石灰を撒いてよく耕して混ぜておくようにすると良い。なおニンジンは今蒔く時には今蒔けるものを選ぶこと。(5月人参など)
28	ニンジン	野菜	その他(農薬)	ニンジンにスミチオンを散布した(アブラムシ防除)。どの位日をおいて食べられるか。	農薬の毒性は植物の差によって異なる。ニンジンには7日位おいた方が良い。